

# 西尾市定期予防接種の対象者（接種時期）

令和7年度

各予防接種の詳細は、冊子『予防接種と子どもの健康』をご覧ください。

| 予防接種名                                        |      | 接種回数           | 標準的な接種期間                                                                | 種類      |
|----------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| ロタウイルス<br>感染症                                |      | 2回<br>(ロタリックス) | 初回接種は生後2か月から14週6日までに開始。2回目及び3回目は前回接種日から27日以上の間隔をあける。                    | 経口生ワクチン |
|                                              |      | 3回<br>(ロタテック)  |                                                                         |         |
| 小児の肺炎球菌感<br>染症                               | 初回   | 3回             | 生後2か月から7か月に至るまでの間に接種。<br>2回目及び3回目は前回接種日から27日以上の間隔をおき、生後12か月に至るまでに終了させる。 | 不活化ワクチン |
|                                              | 追加   | 1回             | 生後12か月から15か月に至るまでの間に接種。<br>生後12か月以降に、初回接種終了後、<br>60日以上の間隔をあける。          |         |
| B型肝炎                                         |      | 3回             | 生後2か月から9か月に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて2回接種し、1回目から139日以上の間隔をおいて3回目を接種。           | 不活化ワクチン |
| ジフテリア<br>百日せき<br>破傷風<br>ポリオ<br>Hib<br>(5種混合) | 初回   | 3回             | 生後2か月から7か月に至るまでの間に接種を開始。<br>20日から56日までの間隔をおき3回接種。                       | 不活化ワクチン |
|                                              | 追加   | 1回             | 初回終了後、6か月から18か月に至るまでの間。                                                 |         |
| BCG                                          |      | 1回             | 生後5か月から8か月に達するまでの間。                                                     | 生ワクチン   |
| 麻しん風しん<br>(MR)                               | 1期   | 1回             | 1歳を過ぎたらできるだけ早めに接種。                                                      | 生ワクチン   |
|                                              | 2期   | 1回             | 保育園幼稚園の年長児相当<br>(年長児相当の4/1～3/31の間に接種)<br>※予診票を接種期間前に個別に発送します。           |         |
| 水痘                                           |      | 2回             | 生後12か月から15か月に至るまでの間に1回目。<br>1回目接種後、6か月から12か月までの間隔をおいて2回目を接種。            | 生ワクチン   |
| 日本脳炎 ※1                                      | 1期初回 | 2回             | 3歳<br>(2回目の接種は1回目接種日から6日から28日までの間隔をおく)                                  | 不活化ワクチン |
|                                              | 1期追加 | 1回             | 4歳<br>(初回終了後、おおむね1年の間隔をおく)                                              |         |

※1 保護者の海外赴任等の理由により、生後6か月～3歳未満で接種を希望される方は、事前に健康課へご相談ください。

西尾市内 指定医療機関一覧表



西尾市ホームページ 市外接種申請



おたふくかぜの一部助成  
詳しくは右の二次元コードから  
ご確認ください。



【外国人向け】予防接種予診票見本

