

## 西尾市定期予防接種の対象者（接種時期）

令和6年度

各予防接種の詳細は、冊子『予防接種と子どもの健康：7. 予防接種の対象となる病気とワクチンについて』をご覧ください。

種類		接種回数	標準的な接種期間		
乳 幼 児	ロタウイルス 感染症		2回 (ロタリックス) ----- 3回 (ロタテック)	初回接種は生後2か月から14週6日まで に開始。2回目及び3回目は前回接種日か ら1週間以上の間隔をあける。	経口生ワクチン
	小児の肺炎球 菌感染症	初回	3回	生後2か月から7か月に至るまでの間に接 種を開始。2回目及び3回目は前回接種日 から27日以上の間隔をおき、生後12か月 に至るまでに終了させる。	不活化ワクチン
		追加	1回	生後2か月から15か月に至るまでの間 生後12か月以降に、初回接種終了後、 60日以上の間隔をあける。	
	B型肝炎		3回	生後2か月から9か月に至るまでの間27日 以上の間隔をおいて2回接種し、1回目か ら139日以上の間隔をおいて3回目を接種 する。	不活化ワクチン
	ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ Hib (5種混合)	1期初回	3回	生後2か月から7か月に至るまでの間に接 種を開始。20日から56日までの間隔をお き3回接種する。	不活化ワクチン
		1期追加	1回	1期終了後、6月から18月の間。	
	BCG		1回	生後5か月から8か月に達するまでの間。	生ワクチン
	麻しん風しん (MR)	1期	1回	1歳を過ぎたらできるだけ早めに接種。	生ワクチン
		2期	1回	保育園幼稚園の年長児相当 (年長児相当の4/1～3/31の間に接種)	
	水痘		1回	生後12か月から15か月の間に、1回目、 1回目接種後、6月から12か月までの間隔 をおいて2回目を接種	生ワクチン
日本脳炎 ※1	1期初回	2回	3歳 (2回目の接種は前回接種日から6日から 28日の間隔をおく)	不活化ワクチン	
	1期追加	1回	4歳 (初回(2回)終了後、おおむね1年(11 月～13月)後)		

※1 保護者の海外赴任等の理由により、生後6か月～3歳未満で接種を希望される方は、事前にご相談ください。