

西尾市定期予防接種の対象者（接種時期）

令和8年度

各予防接種の詳細は、冊子『予防接種と子どもの健康』をご覧ください。

予防接種名		接種回数	標準的な接種期間	種類
ロタウイルス 感染症		2回 (ロタリックス)	初回接種は生後2か月から14週6日までに開始。2 回目及び3回目は前回接種日から27日以上の間隔を あける。	経口生ワクチン
		3回 (ロタテック)		
小児の肺炎球菌感 染症	初回	3回	生後2か月から7か月に至るまでの間に接種。 2回目及び3回目は前回接種日から27日以上の間隔 をおき、生後12か月に至るまでに終了させる。	不活化ワクチン
	追加	1回	生後12か月から15か月に至るまでの間に接種。 生後12か月以降に、初回接種終了後、 60日以上の間隔をあける。	
B型肝炎		3回	生後2か月から9か月に至るまでの間に27日以上 の間隔をおいて2回接種し、1回目から139日以上 の間隔をおいて3回目を接種。	不活化ワクチン
ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ Hib (5種混合)	初回	3回	生後2か月から7か月に至るまでの間に接種を開始。 20日から56日までの間隔をおき3回接種。	不活化ワクチン
	追加	1回	初回終了後、6か月から18か月に至るまでの間。	
BCG		1回	生後5か月から8か月に達するまでの間。	生ワクチン
麻しん風しん (MR)	1期	1回	1歳を過ぎたらできるだけ早めに接種。	生ワクチン
	2期	1回	保育園幼稚園の年長児相当 (年長児相当の4/1～3/31の間に接種) ※予診票を接種期間前に個別に発送します。	
水痘		2回	生後12か月から15か月に至るまでの間に1回目。 1回目接種後、6か月から12か月までの間隔をおい て2回目を接種。	生ワクチン
日本脳炎 ※1	1期初回	2回	3歳 (2回目の接種は1回目接種日から6日から28日ま での間隔をおく)	不活化ワクチン
	1期追加	1回	4歳 (初回終了後、おおむね1年の間隔をおく)	

※1 保護者の海外赴任等の理由により、生後6か月～3歳未満で接種を希望される方は、事前に健康課へ
ご相談ください。

西尾市内 指定医療機関一覧表



西尾市ホームページ 市外接種申請



おたふくかぜの一部助成
詳しくは右の二次元コードから
ご確認ください。



【外国人向け】予防接種予診票見本

- Mẫu tờ khai tiêm chủng trước khi tiêm chủng
- Formulário de pré-exame de vacina çã o
- Sample vaccination pre-examination form

